

Семьи пациентов должны предупреждаться о необходимости наблюдать пациентов на чрезвычайный случай возникновения возбуждения, раздражительности, необычных изменений поведения, также как и случаев суицидальности и о необходимости сообщать о таких случаях врачебному персоналу. Прописывание к приему сероквеля должно быть в минимально необходимом количестве таблеток, соответствующих хорошему самочувствию больного для того, чтобы исключить риск передозировки.

ffffgghghg bnnmbjhg

Гипергликемия и диабет.

Гипергликемия, в некоторых случаях острая и ведущая к кетоацидозу или гиперосмолярной коме или смерти наблюдалась у пациентов лечавшихся атипичными антипсихотиками, включая Сероквель. (см. Обратные реакции. Гипергликемия)

Установление связи между ненормальностями с глюкозой и использованием атипичных антипсихотиков усложнено возможностью увеличенного фонового риска диабета у пациентов с шизофренией и в связи с увеличением числа случаев диабета в общем населении.

Учитывая сказанное, взаимосвязь между применением атипичных антипсихотиков и относимыми к гипергликемии побочными эффектами не полностью ясна.

Однако эпидемиологические исследования предлагают увеличенный риск связанных с гипергликемией побочных эффектов в случаях лечения пациентов атипичными антипсихотиками. Точных цифр оценок риска отнесенных к гипергликемии побочных эффектов при лечении пациентов атипичными антипсихотиками не имеется.

Пациенты с установленным диагнозом диабета, которые начали применять атипичные антипсихотики должны регулярно наблюдаться на ухудшение показателей уровня глюкозы. Пациенты с риск-факторами диабета (например, полнота или семейная история диабетов), которые начинают лечение атипичными антипсихотиками, должны проходить быстрые тесты на глюкозу в крови в начале лечения и периодически в течение лечения. Любой пациент, лечавшийся атипичными антипсихотиками должен обследоваться на симптомы гипергликемии, включая полидипсию, полиурию, полифагию и слабость.

Пациенты, которые получают симптомы гипергликемии во время лечения, должны подвергаться быстрому тестированию уровня глюкозы. В некоторых случаях гипергликемия прекращается, когда прекращен прием атипичного антипсихотика, однако некоторые пациенты требовали продолжения анти-диабетического лечения, несмотря на прекращение приема подозрительного на эффект лекарства.